

Cencio molle

Nome botanico: *Abutilon theophrasti* Medik.

Famiglia: Malvacee

Classe: Dicotiledoni

Cotiledoni: di forma ovale con apice smussato, evidenti le nervature, colore verde chiaro

Foglie: grandi, di forma cordato orbicolare, lungamente picciolate, con margine dentato, tomentose, consistenza morbida.

Fusto: eretto e robusto, ramificato nella parte più alta, ricoperto di peli semplici o stellati. Raggiunge un'altezza di 350 cm

Infiorescenza: solitari oppure in piccole cime ascellari, pentameri, corolla color giallo carico, peduncolati, androceo monoadelfo

Frutto: camario irsuto e deiscete a maturazione

Semi: produce dai 700 ai 44.000 semi per pianta. Ogni frutto contiene mediamente 200 semi. Nel terreno riescono a sopravvivere fino a 50 anni

Ciclo vitale: specie annuale

Moltiplicazione: gamica

Germinazione: primavera-estate

Temperatura di germinazione: 24-30 °C

Fioritura: luglio-ottobre

Diffusione: di origine asiatica, oggi ha toccato quasi tutti i continenti. Forte competitora con le colture sarchiate tra cui la patata, si trova soprattutto nelle zone miti tra cui l'Europa meridionale.

