


# ANNABELLE

**Incrocio: Nicola x Monalisa**  
**Rappresentante: HZPC**



Maturazione	Precoce
Dormienza	Corta
Sviluppo del cespo	Alquanto buono
Colore della buccia	Gialla
Colore della pasta	Gialla intensa
Forma del tubero	Lungovale
Profondità degli occhi	Superficiali
Grossezza del tubero	Di media grandezza
Produzione	Elevata a buona
Contenuto di sostanza	Bassa
Tipo di cottura secca	Resistente alla cottura (A)
Adatta	Consumo fresco
Resistenza accartocciamento	Buona immunità
Resistenza a virus Yn	Buona immunità
Resistenza a peronospora sul cespo	Molto sensibile
Resistenza a peronospora sul tubero	Sensibile
Cancro (fysio 1)	Resistente
Resistenza a nematode della patata Ro1	Immune
Resistenza a nematode della patata Ro2/3	Immune
Scabbia comune	Alquanto sensibile
Resistenza maculatura blu interna	Buona immunità

**ANNABELLE:** Varietà olandese indicata per il consumo fresco, di ottimo sapore soprattutto per fare insalata. Possiede una pasta giallo intenso, uniforme nel calibro e regolare nella forma del tubero. Adottare un piano di concimazione in base ai risultati dell'analisi del terreno. Apportare all'incirca il 10 % in più di azoto in confronto con altre varietà del suo stesso ciclo. La concimazione organica serve per mantenere la coltura in uno stato più vigoroso. La varietà ha un periodo di dormienza breve, reagisce bene all'eventuale taglio dei tuberi seme di grosse dimensioni, il risultato ottimale si ottiene tagliando 2 settimane prima del trapianto. Il taglio aumenta il rischio di infezione, quindi disinfettare il coltello. Consigliato dei trattamenti nel terreno o sul tubero seme contro i principali patogeni tellurici. Lo sviluppo fogliare iniziale è debole, si consiglia di applicare un alto dosaggio iniziale di azoto. Le condizioni climatiche hanno una notevole influenza sull'efficacia dell'erbicida Metribuzin, usare una dose adatta alle circostanze. Sembra essere anche sensibile al Clomazone. Un eccesso azotato causa una maggiore suscettibilità verso la peronospora. Fare molta attenzione al momento del disseccamento della parte vegetale per avere la qualità di cottura dei tuberi desiderata. Inoltre, la pelle deve essere completamente matura prima della raccolta. La varietà è abbastanza resistente alle contusioni a meno che non si verificano delle condizioni estreme. In Italia si coltiva nei territori pianeggianti, soprattutto nei climi mediterranei.