


<h1>ASTERIX</h1> <p>Incrocio: Cardinal x SVP Ve 70-9 Rappresentante: HZPC</p>	
Maturazione	Semitardiva a tardiva
Dormienza	Semi-breve
Sviluppo del cespo	Buono
Colore della buccia	Rossa
Colore della pasta	Alquanto gialla
Forma del tubero	Lungovale
Profondità degli occhi	Superficiali ad alquanto superficiali
Grossezza del tubero	Grande
Produzione	Molto elevata
Contenuto di sostanza secca	Elevata a buona
Tipo di cottura	Alquanto resistente alla cottura (B)
Adatta	Consumo fresco, Patate fritte
Resistenza accartocciamento	Mediamente immune
Resistenza a virus A	Sensibile
Resistenza a virus X	Immune
Resistenza a virus Yn	Alquanto sensibile
Resistenza a peronospora sul cespo	Alquanto sensibile
Resistenza a peronospora sul tubero	Buona immunità
Cancro (fysio I)	Resistente
Resistenza a nematode della patata Ro1	Immune
Scabbia comune	Mediamente immune
Resistenza maculatura blu interna	Alquanto immune

ASTERIX: Varietà olandese che possiede un alto contenuto di sostanza secca, ideale per il fritto casalingo o, a livello industriale, per la produzione di french fries. Caratterizzata da una vegetazione robusta, in condizioni favorevoli si ottengono rese elevate. Adottare un piano di concimazione in base ai risultati dell'analisi del terreno. Ridurre di circa il 20 % la quantità di azoto, per evitare fenomeni di lussureggiamento. Per ottenere alta la sostanza secca è necessaria una distribuzione aggiuntiva di potassio dopo la fase di tuberizzazione. La pre-germogliazione contribuisce ad anticipare la crescita. Può crescere in tutti i tipi terreno, nei terreni pesanti è fondamentale avere una buona struttura. L'uso dell'erbicida Metribuzin è consigliato in pre-emergenza, in caso di post-emergenza usare un dosaggio inferiore. Trattamenti preventivi contro la peronospora sono necessari, a causa dell'eccessiva massa fogliare. Durante la raccolta, importante che la coltura sia allo stadio di naturale maturazione e con sufficiente indurimento dei tuberi. In condizioni favorevoli si ottengono tuberi di grandi dimensioni, quindi raccogliere e conservare con cura per evitare danni e contusioni. La buccia deve essere completamente formata prima della raccolta. La varietà, durante la fase di conservazione, è suscettibile ai funghi da ferita del genere Fusarium e Phoma.