


<h1>BONNATA</h1> <p><b>Incrocio: Bernadette x RZ-95-6643</b>  <b>Rappresentante: Stet Holland</b></p>	
Maturazione	Semiprecoce
Dormienza	Lunga
Sviluppo del cespo	Buono
Colore della buccia	Giallo chiaro
Colore della pasta	Giallo chiaro
Forma del tubero	Ovale
Profondità degli occhi	Alquanto superficiali
Grossezza del tubero	Mediamente grande
Produzione	Elevata
Contenuto di sostanza secca	Buona
Tipo di cottura	Da alquanto resistente alla cottura a farinosa (BC)
Adatta	Consumo fresco, Fritto casalingo
Resistenza a virus Yn	-
Resistenza a peronospora sul cespo	Alquanto tollerante
Resistenza a peronospora sui tuberi	Mediamente tollerante
Cancro (fysio 1)	Resistente
Resistenza a nematode della patata Ro1	Suscettibile
Scabbia comune	Mediamente sensibile
Resistenza maculatura blu interna	Mediamente sensibile

**BONNATA:** Varietà di origine olandese, di recente introduzione nel mercato europeo, indicata per essere lavata oppure confezionata. Inoltre, grazie al suo buon contenuto in amido, si presta bene per il fritto casalingo (home fries). Produce numerosi tuberi per pianta, favorendo così una pezzatura non troppo grossa. Adottare un piano di concimazione in base alle analisi del terreno. Eseguire i criteri standard per quanto riguarda i tre macroelementi, ossia azoto, fosforo e potassio. Mostra una certa sensibilità verso l'erbicida Metribuzin, ridurre la dose nei trattamenti di post emergenza. Nonostante possiede una certa tolleranza nei confronti della peronospora, eseguire comunque un piano di lotta preventivo contro la malattia. Mostra una certa sensibilità verso i danni meccanici, si consiglia di raccogliere i tuberi a maturazione completa della buccia e ridurre l'altezza di caduta. Si adatta principalmente in zone di pianura e leggermente collinari.