


MONDIAL

Incrocio: Spunta x SVP Ve 66295
Rappresentante: HZPC



Maturazione	Da semitardiva a tardiva
Dormienza	Lunga
Sviluppo del cespo	Buono
Colore della buccia	Gialla chiara
Colore della pasta	Giallo chiaro
Forma del tubero	Lungovale
Profondità degli occhi	Superficiali
Grossezza del tubero	Grande
Produzione	Molto elevata
Contenuto di sostanza secca	Da mediocre a bassa
Tipo di cottura	Alquanto resistente alla cottura (B)
Adatta	Consumo fresco
Resistenza accartocciamento	Sensibile
Resistenza a virus A	Immune
Resistenza a virus X	Immune
Resistenza a virus Yn	Sensibile
Resistenza a peronospora sul cespo	Sensibile
Resistenza a peronospora sul tubero	Molto sensibile
Cancro (fysio 1)	Resistente
Resistenza a nematode della patata Ro1	Immune
Scabbia comune	Sensibile
Resistenza maculatura blu interna	Alquanto immune

MONDIAL: varietà di origine tedesca/olandese creata negli anni ottanta, è caratterizzata da un ciclo tardivo, possiede anche una pelle molto attraente. In condizioni ideali riesce a produrre tuberi grossi con rese medie elevate. Inoltre tuberizza in condizioni di giorno corto. Adottare un piano di concimazione in base ai risultati dell'analisi chimiche del terreno. Apportare una quantità di macroelementi, ossia azoto, fosforo e potassio, seguendo i criteri standard. Suddividere la concimazione azotata per evitare un eccessivo sviluppo iniziale dell'apparato fogliare. Durante la piantagione, i germogli devono essere ben robusti per evitare la loro rottura. Può crescere in tutti i tipi terreno, ma sui terreni leggeri con la presenza di nematodi liberi incombe il rischio di spraing (maculatura); si consiglia prendere in atto delle misure preventive contro questi parassiti tellurici. Può essere piantata quando le gemme sono aperte ma una buona pre-germogliazione avvantaggia la coltura. Mantenere di una buona umidità del terreno per evitare infezioni da scabbia comune, possiede comunque una buona resistenza alla siccità. Trattamenti preventivi contro la peronospora sono necessari. La pelle deve essere completamente formata prima della raccolta. I tuberi sono fortemente attaccati ai stoloni. Di solito i tuberi sono grossi, quindi raccogliere e conservare con delicatezza per evitare danni meccanici e imbrunimenti interni. La varietà è diffusa principalmente in Sicilia e Sardegna.

Le dichiarazioni riportate provengono dai campi sperimentali della rispettiva ditta sementiera. Dato che si tratta di un prodotto naturale, non possiamo assumerci nessuna responsabilità in caso di variazione.