

MULBERRY BEAUTY

Incrocio: Gruppo Perupas
Rappresentante: HZPC



Maturazione	Tardiva
Dormienza	Lunga
Colore della buccia	Rossa
Colore della pasta	Rossa
Forma del tubero	Ovale
Grossezza del tubero	Medio
Produzione	Buona
Contenuto in sostanza secca	Media 20,5%
Tipo di cottura	Farinosa (B)
Adatta	Consumo fresco
Resistenza a virus Yn	Resistente
Resistenza a peronospora sul cespo	Molto sensibile
Resistenza a peronospora sul tubero	Molto sensibile
Resistenza a nematode della patata Ro1	Sensibile
Resistenza a nematode della patata Pa 2/3	Sensibile
Scabbia comune	Mediamente resistente

Mulberry Beauty:

Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno. Azoto (N): 50% in confronto con altre varietà a ciclo medio tardivo. La tardiva somministrazione di azoto può portare il ritardo della senescenza, comportando una scarsa qualità dei tuberi per la cottura. Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard. Fare attenzione alla disponibilità di concime organico al fine di evitare una mineralizzazione tardiva. Manganese e magnesio stimolano lo sviluppo di un fogliame robusto e ritardano la senescenza.