ALLISON

Incrocio: HEO 98-1620 X AGATA
Rappresentante: HZPC



Maturazione	Semitardiva
Colore della buccia	Giallo chiaro
Colore della pasta	Crema
Forma del tubero	Ovale / Lungovale
Dimensione dei tuberi	Grande
Produzione	Molto Alta
Contenuto sostanza secca	19.9%
Tipo di cottura	Semifarinosa (B)
Utilizzo culinario	Gnocchi, puree, patate fritte
Danni meccanici	Sensibile
Sensibilità al Metribuzin	abbastanza sensibile
Peronospora sul cespo	Sensibile
Peronospora sui tuberi	Sensibile
Alternaria	buona resistenza
Scabbia comune	mediamente resistente
Scabbia pulvurolenta	mediamente resistente
Resistenza a PMT virus	sensibile
Resistenza a Virus Y	Molto sensibile
Resistenza a Virus Yntn	buona immunità
Resistenza a nematode	buona immunità

Concimazione:
Adattare la concimazione all'analisi del terreno. L'applicazione frazionata può evitare un'eccessiva crescita iniziale del fogliame si consiglia di applicare 2/3 prima della semina e 1/3 in copertura.
Prestare attenzione alla tempistica della concimazione per assicurare una maturazione naturale della coltura.
Azoto (N) : Apporti medi (170-210Kg N/Ha compreso l'apporto del terreno).
Fosfato (P) e Potassio (K) : secondo I consigli standard.
Prestare attenzione alla quantità di fertilizzante organico per evitare una successiva mineralizzazione

Consigli per la coltivazione:
Ricordiamo che il taglio aumenta il rischio di infezioni. Disinfettare il coltello e utilizzare polvere di gesso. Assicurare una rapida asciugatura per una rapida maturazione.
Allison può essere coltivata su tutti i tipi di terreno, una buona pregerminazione preventiva può migliorane la precocità..
Non piantare in terreni freddi per non aumentare il rischio di infezione da Rhizoctonia.
Nonostante la maturazione tardiva, ALLISON ha una tuberizzazione precoce.
Allison è piuttosto sensibile al metribuzin, quindi da usare solo in pre-emergenza. Allison ha una buona tolleranza alla siccità. Utilizzate un rigoroso programma contro la peronospora.
Allison ha una lunga dormienza e una buona conservabilità. Si consiglia di far asciugare rapidamente I tuberi dopo il raccolto e tenere all'asciutto per evitare l'insorgenza della scabbia argentea.

Le dichiarazioni riportate provengono dai campi sperimentali della rispettiva ditta sementiera. Dato che si tratta di un prodotto naturale, non possiamo assumerci nessuna responsabilità in caso di variazione.