


COLOMBA

Incrocio: Carrera x Agata

Rappresentante: HZPC



Maturazione	Precoce
Dormienza	Breve
Colore della buccia	Giallo
Colore della pasta	Giallo
Forma del tubero	Da tondovale a ovale
Grossezza del tubero	Grande
Produzione	Elevata
Contenuto di sostanza secca	Bassa
Tipo di cottura	Da resistente ad alquanto resistente alla cottura (AB)
Adatta	Consumo fresco
Resistenza a virus Yn	Sensibile
Resistenza a peronospora sul cespo	Molto sensibile
Resistenza a peronospora sul tubero	Poco sensibile
Cancro (fysio1)	Resistente
Resistenza a nematode della patata Ro1	Immune
Scabbia comune	Poco sensibile
Resistenza maculatura blu interna	Non sensibile

COLOMBA: Varietà olandese, idonea per una raccolta precoce, con ottimi risultati in diverse condizioni climatiche. Utilizzata per il consumo fresco, possiede una pelle molto attraente e anche una elevata resistenza alla scabbia comune. Adottare un piano di concimazione in base ai risultati del terreno. L'azoto in questo caso può essere distribuito in un'unica dose, dividere la somministrazione non ha alcun effetto. Un alto livello di fosforo è consigliato al fine di favorire lo sviluppo del sistema radicale. Per ottenere una raccolta precoce, è consigliabile non usare letame. La varietà è suscettibile alla carenza del magnesio, quindi concimare con la presenza di questo microelemento. Possiede una dormienza breve, reagisce bene al taglio dei tuberi seme di grosse dimensioni, l'ideale sarebbe tagliando 2 settimane prima della semina. Leggermente sensibile alla tuberomania, quindi piantare in terreni caldi. Si adatta in tutti i tipi di terreno, effettuare un trattamento nel suolo contro la rhizoctonia. Le condizioni climatiche hanno una notevole influenza sull'efficacia del Metribuzin, usare una dose adatta alle circostanze. L'irrigazione è consigliabile in condizioni di siccità. Attuare una accurata protezione contro la peronospora, soprattutto la parte fogliare. Condizioni di temperatura elevate provocano ricacci. In base all'andamento climatico può essere raccolta dopo 90 giorni. Essendo una varietà precoce, per una lunga conservazione è necessario l'uso di un anti germogliamento. In Italia è diffusa in tutto il territorio nazionale a bassa quota.