

LUCINDA

Incrocio: VIVALDI X CARRERA

Rappresentante: HZPC



Maturazione	Semitardiva
Colore della buccia	Giallo chiaro
Colore della pasta	Giallo
Forma del tubero	Ovale
Dimensione dei tuberi	Grande
Produzione	Alta
Contenuto sostanza secca	17.2 %
Tipo di cottura	Abbastanza resistente alla cottura tipo (A/B)
Danni meccanici	Sensibile
Sensibilità al Metribuzin	Molto resistente
Peronospora sul cespo	Abbastanza sensibile
Peronospora sui tuberi	Mediamente resistente
Alternaria	Sensibile
Scabbia comune	Mediamente resistente
Scabbia pulvulenta	Abbastanza sensibile
Resistenza a Virus Y	Molto sensibile
Resistenza a Virus Yntn	Buona immunità
Resistenza a nematode	Buona immunità

Concimazione:

Adattare la concimazione all'analisi del terreno.

L'applicazione frazionata può evitare un'eccessiva crescita iniziale del fogliame

Applicare 2/3 prima della semina e 1/3 in copertura

Azoto (N) : Apporto alto (210-250 Kg N/Ha compreso l'apporto del terreno).

Potassio (K): 200 Kg/Ha. in presemina e 250 Kg./Ha dopo la tuberizzazione

Fosfato (P): 90/100 Kg/Ha in presemina

L'apporto di manganese e magnesio favoriscono un fogliame forte e ne prevengono una senescenza precoce.

Consigli per la coltivazione:

Lucinda può essere coltivata su tutti i tipi di terreno, una buona germinazione preventiva per migliorarne la precocità. Non piantare in terreni freddi. Lucinda ha una buona tolleranza alla metribuzina (Sencor). Utilizzare un robusto programma contro la Phytophthora, per prevenire la peronospora del fogliame e dei tuberi. Utilizzare prodotti che abbiano effetto su Alternaria solani e Alternaria alternata.

Per avere una corretta maturazione della buccia, attendere almeno tre settimane per la scavatura dopo l'eliminazione dell'apparato fogliare. Essendo moderatamente suscettibile alle ammaccature, in fase di scavo ridurre al massimo l'altezza di caduta ed evitare i danni meccanici.